

# MYRTE

## SYZYGIUM

### CENDRAWASIH



#### Présentation

Le Myrte est une espèce d'arbuste buissonnant originaire des régions tropicales à sub-tropicales d'Asie et d'Australie. Il produit de très petites fleurs pendantes suivies de fruits. Les feuilles, naturellement très petites (0,5 à 1,5cm) sont alternes, avec des pétioles très courts, et disposées de part et d'autre de branches arquées, sur un plan plat. L'écorce finement fissurée est très décorative, même sur des sujets jeunes, ce qui est très intéressant en bonsaï. C'est une espèce vigoureuse, parfaitement adaptée à la création de bonsaï de taille petite à moyenne (shohin).

#### Exposition

Exposition ensoleillée. Le Myrte apprécie les températures entre 20 et 30°C. Il dépérit s'il est continuellement exposé à des températures inférieures à 15°C, mais peut très bien supporter des nuits à 12° par exemple. Préférez une position face à une fenêtre exposée au Sud. Il se dégarnit de l'intérieur néanmoins, même avec un éclairage artificiel durant l'automne, ce qui est normal et ne compromet pas sa survie. L'espèce craint aussi les atmosphères trop sèches, et il faut lui éviter la proximité du radiateur en hiver. Il est conseillé d'augmenter l'hygrométrie ambiante en le disposant sur un plateau rempli de billes d'argile baignant dans l'eau (la surface inférieure du pot ne devant pas baigner).

#### Fertilisation

L'espèce est gourmande, il faut la fertiliser toutes les semaines en période de forte activité végétative, toutes les 3 semaines à un mois le reste du temps. Utiliser un engrais organique liquide de préférence.

#### Taille et mise en forme

L'espèce bourgeonne très bien en arrière et a tendance à produire des pousses constamment. Il faut donc pincer régulièrement en maintenant la forme désirée afin de stimuler le percement des bourgeons en arrière et afin de garder le feuillage compact et proche du tronc. On taille selon les besoins entre 2 feuilles, ce qui est assez fastidieux étant donné la petite taille des feuilles et la densité de végétation à tailler. La taille de structure sévère ne pose pas de problème particulier et peut se faire toute l'année. La ligature se pratique couramment car le bois reste souple longtemps. Attention à ne pas ligaturer les branches trop jeunes qui peuvent être blessées facilement.

#### Arrosage

L'arrosage doit être soutenu. Le substrat ne doit jamais sécher intégralement et il faut arroser dès qu'il devient sec au toucher en surface. Le stress hydrique provoque des feuilles pendantes qui peuvent vite jaunir et tomber.